

Estudi de fertilitat

Protocol per obtenir i lliurar una mostra fiable
per a l'estudi de fertilitat.

PREPARACIÓ I OBTENCIÓ



1 Abstinència i preparació

Mantingueu entre 2 i 7 dies d'abstinència sexual abans de la prova.



2 Higiene i material


Renteu-vos els genitals amb aigua i sabó. Utilitzeu exclusivament el flascó estèril Anaclin de 50 ml.



3 Mètode de recollida

La mostra s'ha d'obtenir mitjançant masturbació, recollir-se completa i sense utilitzar preservatius ni cremes.

TRANSPORT I LLIURAMENT DE LA MOSTRA



4 Transport tèrmic

Porteu el flascó en una butxaca propera al cos per mantenir la temperatura de la mostra.



5 Temps límit de lliurament

Lliureu la mostra al laboratori en un termini màxim de 30 minuts després de la seva recollida.



6 Punt de lliurament

Lliureu la mostra a la Sala d'Extraccions, situada a la planta -1 de l'Hospital.

Estudio de fertilidad

Protocolo para obtener y entregar una muestra fiable para el estudio de fertilidad.

PREPARACIÓN Y OBTENCIÓN



1 Abstinencia y preparación

Mantenga entre 2 y 7 días de abstinencia sexual antes de la prueba.



2 Higiene y material


Lávese los genitales con agua y jabón. Utilice exclusivamente el frasco estéril Anaclin de 50 ml.



3 Método de recogida

La muestra debe obtenerse mediante masturbación, recogerse por completo y sin utilizar preservativos ni cremas.

TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA MUESTRA



4 Transporte térmico

Lleve el frasco en un bolsillo próximo al cuerpo para mantener la temperatura de la muestra.



5 Tiempo límite de entrega

Entregue la muestra al Laboratorio en un plazo máximo de 30 minutos después de su recogida.



6 Ubicación de entrega

Entregue la muestra en la Sala de Extracciones, situada en la planta -1 del Hospital.