

Obtenció de mostra de femta per a l'estudi Parasitològic (1 mostra)

Aquesta prova es realitza per detectar paràsits a la femta.

PREPARACIÓ I SEURETAT




3 dies abans de la prova:

No mengeu llegums, fruites amb llavors, antibiòtics, laxants i antiàcids tres dies abans de la prova.



El líquid interior és TÒXIC:

Conté SAF; **no ingerir i mantenir-lo fora de l'abast dels nens.**



Conservació adequada:

Guardeu l'envàs a **temperatura ambient** amb l'extrem cònic cap amunt; **mai a la nevera.**

PROCÉS DE RECOLLIDA



1 Recollida de la mostra:

Utilitzeu un recipient net i recolliu una mostra de femta fresca d'una mida similar a un cigró.



2 Mescla amb el reactiu:

Introduïu la pala amb la mostra al tub que conté el líquid reactiu i tanqueu-lo hermèticament.



3 Finalització del procés:

Agiteu suaument el tub, sense capgirar-lo, i renteu-vos les mans amb aigua i sabó.



En cas d'ingestió accidental

Situació	Acció Immediata	Contacte d'Emergència
 Ingestió accidental	 Beure molta llet o aigua	 Tel. 91 562 04 20
 Contacte amb pell o ulls	 Rentar amb abundant aigua	 Servei Inf. Toxicològica

Podeu recollir els contenidors al taulell d'extraccions de l'Hospital (planta -1), de **dilluns a divendres de 7:30 a 10:00 h**, o us els facilitarà el personal sanitari durant la vostra visita.

Obtención de muestra de heces para el estudio Parasitológico (1 muestra)

Esta prueba se realiza para detectar parásitos en las heces.

PREPARACIÓN Y SEGURIDAD




3 días antes de la prueba:

Evite legumbres, frutas con semillas, antibióticos, laxantes y antiácidos tres días antes de la prueba.



El líquido interior es TÓXICO:

Contiene SAF; **no ingerir y mantener fuera del alcance de los niños.**



Conservación adecuada:


Guarde el envase a **temperatura ambiente** con el extremo cónico hacia arriba; **nunca en la nevera.**

PROCESO DE RECOGIDA



1 Recogida de la muestra:

Utilice un recipiente limpio y recoja una muestra de heces frescas de un tamaño aproximado al de un garbanzo.



2 Mezcla con el reactivo:

Introduzca la paleta con la muestra en el tubo que contiene el líquido reactivo y ciérrelo herméticamente.



3 Finalización del proceso:

Agite suavemente el tubo, sin invertirlo, y lávese las manos con agua y jabón.



En caso de ingestión accidental

	Situación	Acción Inmediata	Contacto de Emergencia
	Ingestión accidental	Beber mucha leche o agua	Tel. 91 562 04 20
	Contacto con piel u ojos	Lavar con abundante agua	Servicio Inf. Toxicológica

Puede recoger los contenedores en el mostrador de extracciones del Hospital (planta -1), de **lunes a viernes de 7:30 a 10:00 h**, o se los facilitará el personal sanitario durante su visita.