

Obtenció mostra de femta (Esteatòcrit)

S'utilitza per realitzar determinacions de Calprotectina, Elastasa, sang oculta en femta, coprocultiu i esteatòcrit.

PREPARACIÓ



Dieta de 100 g de greix al dia

Mantingueu aquesta dieta durant els tres dies previs i el dia de la recollida de la mostra.



Eviteu la realització d'exploracions amb contrast mèdic.

No recolliu la mostra si us han administrat contrast per a una exploració radiològica.

RECOLLIDA I CONSERVACIÓ



Recolliu una mostra de la mida aproximada d'una nou

Recolliu entre 5 i 10 ml (10 g) de mostra en un flascó estèril de boca ampla.



Eviteu la contaminació de la mostra

La mostra no ha d'entrar en contacte amb aigua ni amb orina.




Conservació de la mostra i lliurament

Conserveu la mostra entre 2 i 8 °C, protegida de la llum, i lliureu-la abans de 72 hores.

Obtención muestra de heces (Esteatócrito)

Se utiliza para realizar determinaciones de Calprotectina, Elastasa, sangre oculta en heces, coprocultivo i esteatocrito

PREPARACIÓN



Dieta con 100 g de grasa al día

Mantenga esta dieta durante los tres días previos y el día de la recogida de la muestra.



Evite la realización de exploraciones con contraste médico.

No recoja la muestra si se le ha administrado contraste para una exploración radiológica.

RECOGIDA Y CONSERVACIÓN



Recoja una muestra de un tamaño aproximado al de una nuez

Recoja entre 5 y 10 ml (10 g) de muestra en un frasco estéril de boca ancha.



Evite la contaminación de la muestra

La muestra no debe entrar en contacto con agua ni con orina.



Conservación de la muestra y entrega

Conserve la muestra entre 2 y 8 °C, protegida de la luz, y entréguela antes de 72 horas.