

Recollida de mostra de femta

S'utilitza per a realitzar determinacions de Calprotectina, Elastasa, sang oculta en femta i coprocultiu.

PROCÉS DE RECOLLIDA



Reculli la mida d'una nou



Obtingui una quantitat de 10 g o entre 5-10 ml de femta.



Utilitzi un recipient estèril de boca ampla

Col·loqui la mostra en un flascó Anaclín de 50 ml amb tap de rosca.



Eviti contaminar la mostra

És fonamental que la mostra no entri en contacte amb aigua o orina.

RECOMANACIONS I LLIURAMENT



Mantingui la mostra a la nevera i sense llum

Refrigerar entre 2 i 8 °C i mantenir el recipient tapat per evitar la llum.



Lliurament en menys de 72 hores

Porti la mostra al laboratori preferentment abans que passin tres dies.

Recogida de muestra de heces

Se utiliza para realizar determinaciones de Calprotectina, Elastasa, sangre oculta en heces y coprocultivo.

PROCESO DE RECOGIDA



Recoja el tamaño de una nuez



Obtenga una cantidad de 10 g o entre 5-10 ml de heces.



Use un recipiente estéril de boca ancha

Coloque la muestra en un frasco Anaclín de 50 ml con tapón de rosca.



Evite contaminar la muestra

Es fundamental que la muestra no entre en contacto con agua u orina.

RECOMENDACIONES Y ENTREGA



Mantenga en nevera y sin luz

Refrigerar entre 2-8 °C y mantener el recipiente tapado para evitar la luz.



Entrega en menos de 72 horas

Lleve la muestra al laboratorio preferentemente antes de que pasen tres días.